

— الاستخدام

دعم عشبي في إدارة الإجهاد والإجهاد الحراري

— الفوائد للقطيع

- دعم هدوء القطيع أثناء الإجهاد الحراري
- المساهمة في تجاوز أكثر سلاسة لعمليات النقل والتحصين
- دعم انتظام استهلاك العلف في الظروف المجهدة

— الاستخدام والجرعة حسب حاجة القطيع

الاستخدام	الجرعة والمدة
الدعم في إجهاد التحصين أو التغيرات الإدارية	٢٥٠ سم مكعب لكل ١٠٠٠ لتر ماء
الدعم في الإجهاد الحراري	٨ ساعات يوميًا ٢٥٠ سم مكعب لكل ١٠٠٠ لتر ماء
الدعم في الاستسقاء (تراكم السوائل في البطن، مع منتوسيل)	٢٥٠ سم مكعب لكل ١٠٠٠ لتر ماء
الدعم في الضعف الشديد والانخفاض المفاجئ للقطيع (مع ليوسيل)	٢٥٠ سم مكعب لكل ١٠٠٠ لتر ماء
الدعم في ضعف الحركة الناتج عن الازدحام أو الإجهاد البيئي	٢٥٠ سم مكعب لكل ١٠٠٠ لتر ماء
الدعم المضاد للأكسدة في الضعف العام للقطيع	كمضاد للأكسدة ومقلل للتوتر

ملاحظة السلامة: الأرقام المذكورة أعلاه هي إرشادات عامة لاستهلاك المنتج، وليست بروتوكول علاج. يتم تحديد اختيار المنتج وكميته ومدة استخدامه دائمًا من قبل الطبيب البيطري المسؤول عن القطيع وملصق المنتج؛ هذه المنتجات هي مكملات داعمة وليست بديلاً للعلاج أو اللقاحات.